

Tratamiento de fisioterapia en un caso clínico de parálisis facial

Anexos

Tabla número 1:

Movimiento	Balance articular activo	Balance articular pasivo
Flexión	65°	70°
Extensión	50°	60°
Rotación derecha	75°	80°
Rotación izquierda	70°	80°
Inclinación lateral derecha	40°	45°
Inclinación lateral izquierda	35°	45°

Tabla número 2:

Movimiento	Balance articular activo	Balance articular pasivo
Flexión	60°	70°
Extensión	45°	55°
Rotación derecha	75°	80°
Rotación izquierda	70°	75°
Inclinación lateral derecha	40°	45°
Inclinación lateral izquierda	40°	45°

Tabla número 3:

Movimiento	Balance articular activo	Balance articular pasivo
Flexión	65°	70°
Extensión	50°	60°
Rotación derecha	75°	80°
Rotación izquierda	65°	75°
Inclinación lateral derecha	35°	45°
Inclinación lateral izquierda	40°	45°

Tabla número 4:

Músculo	Balance muscular
Frontal	1'5: movimiento incompleto.
Depresor de la ceja	1+: depresión de la parte media.
Orbiculares de los ojos	2-: ligera abertura entre los párpados.
Piramidal de la nariz	2'5: pliegues bien formados.
Transverso de la nariz	2'5: formación de arrugas.
Zigomático Mayor y menor	2: crecimiento del sillón nasogeniano.
Elevador del labio superior	2+: ligera subida del labio superior.
Depresor del labio inferior	2: ligero descenso sin simetría.
Buccinador	2: comienzo de fuerza de la comisura.

Depresor del ángulo oral	2'5: comienzo de relieve cutáneo y visibilidad de los dientes inferiores.
Orbiculares de los labios	1'5: disminución de la mitad de la longitud del labio.
Platisma	2: movimiento simétrico con un ligero descenso del labio inferior.

Tabla número 5:

Músculo	Balance muscular
Frontal	1'5: movimiento incompleto.
Depresor de la ceja	1'5: movimiento de la parte media.
Orbiculares de los ojos	3-: movimiento casi simétrico.
Piramidal de la nariz	2'5: pliegues bien formados.
Transverso de la nariz	2'5: formación de arrugas.
Zigomático Mayor y menor	2: crecimiento del sillón nasogeniano.
Elevador del labio superior	2+: ligera subida del labio superior.
Depresor del labio inferior	2: ligero descenso sin simetría.
Buccinador	2: comienzo de fuerza de la comisura.
Depresor del ángulo oral	2'5: comienzo de relieve cutáneo y visibilidad de los dientes inferiores.
Orbiculares de los labios	1'5: disminución de la mitad de la longitud del labio.
Platisma	2: movimiento simétrico con un ligero descenso del labio inferior.

Tabla número 6:

Músculo	Balance muscular
Frontal	2'5: varios signos de fuerza sin simetría.
Depresor de la ceja	2+: movimiento de la parte interna.
Orbiculares de los ojos	3-: movimiento casi simétrico.
Piramidal de la nariz	2'5: pliegues bien formados.
Transverso de la nariz	2'5: formación de arrugas.
Zigomático Mayor y menor	2: crecimiento del sillón nasogeniano.
Elevador del labio superior	2+: ligera subida del labio superior.
Depresor del labio inferior	2: ligero descenso sin simetría.
Buccinador	2: comienzo de fuerza de la comisura.
Depresor del ángulo oral	2'5: comienzo de relieve cutáneo y visibilidad de los dientes inferiores.
Orbiculares de los labios	2: inflamamiento de carrillos sin fuga.
Platisma	2: movimiento simétrico con un ligero descenso del labio inferior.