

Ocronos. Revista Médica y de Enfermería – ISSN nº 2603-8358 – Depósito legal: CA-27-2019 ocronos.com - revistamedica.com

Proceso de atención de Enfermería en adolescente gestante con diagnóstico de ruptura prematura de membranas

PLAN DE ATENCIÓN DE ENFERMERÍA

Valoración	Etiquetas	NOC (Resultados	NIC (Intervenciones)
	Diagnóstica	Esperados)	·
Sangrado	Dominio	0703 Severidad	4020 Disminución de la hemorragia:
transvaginal	11:	de la pérdida de	Identificar la causa de la hemorragia.
	Seguridad /	Sangre	Monitorizar de forma exhaustiva al paciente en
	Protección	Indicador:	busca de hemorragia.
		041307 Sangrado	Registrar el nivel de hemoglobina-hematocrito
	Clase 2:	Vaginal	antes y después de la pérdida de sangre.
	Lesión física 401	041313 Palidez	Monitorizar la presión arterial y de los
	Etiquetas	de piel y mucosas	parámetros hemodinámicos, si están
	Diagnósticas:	041316	disponibles (p. ej., presión venosa central y
	00206 Riesgo de	Disminución de la	presión capilar pulmonar/de enclavamiento de la
	Sangrado	hemoglobina	arteria pulmonar).
	Relacionado con		Instruir al paciente y/o a la familia acerca de los
	Complicaciones	041317	signos de hemorragia y sobre las acciones
	en el embarazo	Disminución del	apropiadas (avisar al profesional de Enfermería)
		hematocrito	si se produjeran más hemorragias.
			Instruir al paciente sobre las restricciones de
		Parámetro:	actividades.
		Grave 1	Instruir al paciente y a la familia sobre la
		Sustancial 2	gravedad de la pérdida de sangre y sobre las
		Moderado 3	acciones adecuadas que han de tomarse.
		Leve 4	6960 Cuidados prenatales:
		Ninguno 5	Identificar las necesidades, preocupaciones y
			preferencias de la paciente, fomentar la
			implicación en la toma de decisiones e
			identificar y abordar los obstáculos para los
			cuidados. Comentar la importancia de participar
			en los cuidados prenatales durante toda la
			gestación, alentando a la vez la implicación de
			la pareja de la paciente o de otro familiar.
			Monitorizar los tonos cardíacos fetales.
			Medir la altura del fondo uterino y comparar con
			la edad gestacional. Monitorizar los movimientos fetales.
			Instruir a la paciente sobre la percepción de los
			movimientos fetales y la importancia de
			monitorizar la actividad fetal.
			Monitorizar la presentación fetal. Instruir a la
			paciente sobre los signos de peligro que
			requieren su notificación inmediata.
			Ayudar a la paciente a identificar estrategias
			para afrontar los cambios y aliviar las molestias
			asociadas con el embarazo.



Ocronos. Revista Médica y de Enfermería – ISSN nº 2603-8358 – Depósito legal: CA-27-2019 ocronos.com - revistamedica.com

Valoración	Etiquetas	NOC (Resultados	NIC (Intervenciones)
7 4.0.40.0		•	Tille (illies verieselles)
Sangrado Transvaginal	Diagnóstica Dominio 11: Seguridad / Protección Clase 1: Infección Etiquetas Diagnósticas: 00004 Riesgo de Infección Ruptura Prematura de Membranas	Esperados) 0703 Severidad de la infección Indicador: 070307 Fiebre 070333 Dolor 070326 Aumento de leucocitos Parámetro: Grave 1 Moderado 3 Leve 4 Ninguno 5	6540 Control de infecciones Lavarse las manos antes y después de cada actividad de cuidados de pacientes. Usar guantes según lo exigen las normas de precaución universal. Limpiar la piel del paciente con un agente antibacteriano apropiado. Ordenar al paciente que tome antibióticos, según prescripción. Instruir al paciente y a la familia acerca de los signos y síntomas de infección y cuándo se deben notificar al cuidador. Enseñar al paciente y a la familia a evitar infecciones
			6500 Cuidados del embarazo de alto riesgo: Revisar el historial obstétrico para ver si hay factores de riesgo (prematuridad, posmadurez, preeclampsia, embarazo múltiple, crecimiento intrauterino retardado, desprendimiento de Placenta, placenta previa, sensibilización Rh, rotura prematura de membranas y antecedentes familiares de trastornos genéticos). Escribir guías sobre signos y síntomas que requieran atención médica inmediata (hemorragia vaginal roja brillante, cambios en el líquido amniótico, disminución del movimiento fetal, cuatro o más contracciones por hora antes de las 37 semanas de gestación, cefaleas, trastornos visuales, dolor epigástrico y rápida ganancia de peso con edema facial). Explicar los riesgos fetales asociados con partos prematuros en las diversas edades de gestación.