

Manejo de un paciente automedicado con AINEs en la oficina de farmacia

Anexos

PRM	RNM	INTERVENCIÓN FARMACÉUTICA
Distensión insuficientemente tratada	Necesidad	Medidas no farmacológicas junto con administración vía oral de ibuprofeno 400 y vía tópica de Voltaren emulgel.
Medicamento no indicado (paracetamol 650mg)	No necesidad	Supresión del tratamiento.
Medicamento no prescrito (paracetamol 1g)	No necesidad	No dispensación.
Sobredosificación (ibuprofeno 400mg + diclofenaco 50mg + enantyum 25mg)	Inseguridad	Educación sanitaria, mantener únicamente el ibuprofeno y medidas no farmacológicas e indicar remedio fitoterápico y dieta blanda para efecto adverso de la sobredosificación (dolor epigástrico).
Incumplimiento terapéutico (comenzar a jugar partidos antes de lo pautado)	Inseguridad	Aconsejarle reposar y aumentar la carga de trabajo gradualmente.
Administración errónea (Toma de AINE en ayunas)	Inseguridad	Insistir con que la administración sea junto con comida.
Medicamentos no indicados (infiltraciones locales a base de anestésicos locales y corticoides)	No necesidad	Advertirle de los riesgos y de la no adecuación a su caso.

Tabla 1; PRM; Problema relacionado con el medicamento. RNM; Resultado negativo de la medicación.