

Factores de riesgo psicosociales presentes en el personal de salud en tiempo de pandemia COVID-19 en el Hospital Básico “El Ángel”, 2020

Anexos

Tabla 1. Descripción de la muestra

Tabla 1 Variables Nominales		
Edad	No	%
<= 22	1	2.5%
23 – 29	6	15%
30 – 36	15	37.5%
37 – 44	9	22.5%
45-59	9	22.5%
Lugar de trabajo	No	%
Hospitalización	14	35%
Emergencia	6	15%
Consulta externa	9	22.5%
Triaje diferenciado	3	7.5%
Administrativo	8	20%
Jornada	No	%
12 horas	4	10%
24 horas	16	40%
8 horas	20	50%

N=40. Fuente: De la Cruz (2020)

Tabla 2. Valores descriptivos por variable del Instrumento SPSS

Variables	Muy alto		Alto		Medio		Bajo		Muy Bajo	
Síntomas fisiológicos.	1	2.5%	5	12.5%	13	32.5%	15	37.5%	6	15%
Síntomas de comportamiento social.	0	0%	0	0%	1	2.5%	10	25%	29	72.5%
Síntomas intelectuales y laborales.	0	0%	0	0%	0	0%	5	12.5%	35	87,5%
Síntomas psicoemocionales	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	40	100%

N=40. Fuente: De la Cruz (2020)

Tabla 3. Tabla de inferencia estadística variables nominales y su variable dependiente.

Variable nominal	Síntomas Fisiológicos	Síntomas de comportamiento social	Síntomas Intelectuales y laborales	Síntomas psicoemocionales	Estrés total
Edad	0,40	0,00*	0,03*	a	0,016*
Lugar de trabajo	0,05	0,047*	0,23	a	0,79
Jornada	0,68	0,45	0,71	a	0,23

N=40. (*) Prueba de Chí-cuadrado valores inferenciales por debajo de 0,05. Fuente: De la Cruz (2020)

Tabla 4. Asociación entre lugar de trabajo y síntomas de comportamiento social.

Lugar de trabajo	OR	Intervalo de confianza	
		Inferior	Superior
Hospitalización	1,5	1,3	1,9
Emergencia	1,18	1,03	1,3
Triaje diferenciado	19,5	5	75,2

N=40. Fuente: De la Cruz (2020)

Tabla 5. Asociación entre edad y estrés total.

Edad	OR	Intervalo de confianza	
		Inferior	Superior
23,00 - 29,40	11,6	1,65	81,1

N=40. Fuente: De la Cruz (2020)