Revista Ocronos. ISSN nº 2603-8358 – Depósito legal: CA-27-2019
Editorial Científico-Técnica Ocronos - ocronos.com

Riesgo biológico en Fisioterapia

Tabla 1. *Probabilidad de desarrollar infección después de un contacto con fuente positiva*

INFECCIÓN	PROBABILIDAD
Hepatitis B	30%
Hepatitis C	1,8% (0%-7%)
VIH exposición percutánea	0,3% (0,2%-0,5%)
VIH exposición mucosa	0,09% (0,006%-0,5%)

Fuente: Revista Tribuna Médica. Riesgo Biológico en Profesionales de la Salud. [20]

Tabla 2. *Nivel de riesgo biológico*

ALTO	MEDIO	BAJO
Áreas donde existe contacto directo y permanente con sangre y fluidos donde se aplican las precauciones universales.	Áreas donde existe contacto no permanente con sangre y fluidos donde se aplican las precauciones universales.	Áreas donde no hay contacto con sangre ni fluidos corporales.
Especializaciones quirúrgicas, salas de cirugía, urgencias, unidad renal, unidad de quemados, banco de sangre, laboratorio clínico, unidad de cuidados intensivos, servicio de odontología.	Mantenimiento, aseo lavandería, consultas externas, neurología, terapia respiratoria, urología, pediatría, imágenes diagnósticas.	Cocina, nutrición, Fisioterapia, farmacia, secciones administrativas.

Fuente: Bernal, Marta (2003)

Tabla 3. Riesgos biológicos del personal sanitario y su transmisión a los pacientes

Infección	Riesgo de transmisión	
	De paciente a sanitario	De sanitario a paciente
Transmisión sérica		
HIV/sida	Bajo	Muy poco frecuente
Hepatitis B	Intermedio	Poco frecuente
Hepatitis C	Bajo	Muy poco frecuente
Transmisión respiratoria		
Tuberculosis	Intermedio	Intermedio
Gripe	Alto	Alto
Sarampión	Muy alto	Muy alto
Tos ferina	Alto	Alto
Parotiditis	Intermedio	Intermedio
Rubéola	Intermedio	Intermedio
VRS	Alto	Alto
Infección meningocócica	Muy poco frecuente	?

Infección	Riesgo de transmisión	
	De paciente a sanitario	De sanitario a paciente
Parvovirus B19	Intermedio	?
Transmisión entérica		
Hepatitis A	Bajo	Muy poco frecuente
Rotavirus	Intermedio	Intermedio
Salmonella/Shigella	Bajo	Bajo
Transmisión por contacto		
Herpes simple	Bajo	Bajo
Varicela-herpes zoster	Alto	Alto
Staphylococcus aureus	Bajo	Bajo
Streptococcus grupo A	Bajo	Bajo
Sarna	Bajo	Bajo
Citomegalovirus	Bajo	Bajo
Conjuntivitis vírica	Alto	Alto

Fuente: Doebbeling, B.N. (2016)[24]