

Enfermedad de Hansen (Lepra): Presentación de un caso

(Tabla 1)

Tabla 1. Clasificación de Ridley-Jopling y OMS	
Clasificación de Ridley-Jopling	Clasificación de la Organización Mundial de la Salud (OMS)
Indeterminada (I) Tuberculoide (TT) Borderline tuberculoide (BT)	Paucibacilar (PB) 1 a 5 lesiones cutáneas.
Media borderline (BB) Borderline lepromatosa (BL) Lepromatosa (LL)	Multibacilar (MB) >5 lesiones cutáneas.

Fuente: Concha M. Cosio, L. Salazar, I. Fich, F. Pérez, C. & González, S. 2008. Enfermedad de Hansen: vez al mes durante un año (4).

(Tabla 2)

Tabla 2. Esquemas terapéuticos de la OMS y Estados Unidos de América					
Lepra		Dapsona	Rifampicina	Clofazimina	Duración
Paucibacilar (PB)	OMS	100 mg/d	600 mg/mes		6 meses
	USA	100 mg/d	600 mg/mes		12 meses
Multibacilar (MB)	OMS	100 mg/d	600 mg/mes	50 mg/d + 300 mg/mes	12 meses
	USA	100 mg/d	600 mg/d	50 mg/d	24 meses

Fuente: Concha M. Cosio, L. Salazar, I. Fich, F. Pérez, C. & González, S. 2008. Enfermedad de Hansen: Revisión a propósito de un caso. Revista Chilena de Infectología, 25 (1), 64-69.

Figura 1. Lesiones nodulares eritematosas anestésicas con descamación y pérdida de anexos cutáneos.



Examen histopatológico




Figura 2. Cambios histológicos de la lepra lepromatosa: atrofia epitelial, banda sub-basal y un denso infiltrado formando mayoritariamente por macrófagos vacuolados.