

Proceso de Atención de Enfermería: bypass iliofemoral

ANEXOS

ANEXO I: ESCALA NORTON

ESTADO FÍSICO	ESTADO MENTAL	MOVILIDAD	ACTIVIDAD	INCONTINENCIA
BUENO 4	ALERTA 4	TOTAL 4	AMBULANTE 4	NINGUNA 4
MEDIANO 3	APÁTICO 3	DISMINUIDA 3	CON AYUDA 3	OCASIONAL 3
REGULAR 2	CONFUSO 2	MUY LIMITADA 2	SENTADO 2	URINARIA O FECAL 2
BAJO 1	COMATOSO 1	INMÓVIL 1	ENCAMADO 1	URINARIA + FECAL 1

Interpretación escala Norton:

5-9 Riesgo muy alto
 10-12: Riesgo alto.
 13-14: Riesgo medio.
 Más de 14: Mínimo o no hay riesgo.

ANEXO II: ESCALA RAMSAY

Nivel de descripción	
DESPIERTO	
1	Ansioso y/o agitado.
2	Colaborador, tranquilo y orientado. Apertura de ojos, somnoliento.
3	Responde a estímulos verbales.
DORMIDO	
4	Quieto, ojos cerrados. Rápida respuesta a estímulos verbales.
5	Respuesta lenta, solo responde a estímulos importantes.
6	No responde.

Valora objetivamente el grado de sedación del paciente, el nivel de sedación que el médico desea en cada momento.

Según el fármaco (propofol, cloruro morfíco) permite ajustar la dosis y el tiempo de infusión, según la profundidad de sedación y la duración en el paciente.