

Prevalencia de COVID-19 durante la primera oleada en una Zona Básica de Salud

Anexos

Tabla 1. Características de la muestra

Características	n = 651
Media de edad ± Desviación estándar (años)	49,17 ± 20,51
Grupos de edad 7-17/18-30/31-40/41-50/51-60/61-70/71-80/81-90/>90	15/115/116/130/107/65/36/35/35
Género (% mujeres/hombres)	57,45/42,54
Sanitarios o sociosanitarios (%)	15,20
Procedencia (% domicilio/residencia Avenida/residencia Sagrada Familia/residencia Raessa/residencia Virgen de Loreto)	91,1/4,3/4/0,3/0,3
Seguimiento (% sintomáticos/contacto estrecho)	76,19/23,80
Media inicio seguimiento telefónico ± Desviación estándar (días)	4,18 ± 6,89
Factores de riesgo cardiovascular (% HTA/DM)	20,73/8,60
Antecedentes cardiológicos (% cardiopatía isquémica/insuficiencia cardíaca/fibrilación auricular)	1,53/1,53/3,22
Antecedentes neurológicos (% ictus o AIT)	5,06
Antecedentes neumológicos (% EPOC/asma)	3,37/9,37
Antecedentes renales (% enfermedad renal crónica)	3,99
Neoplasia activa (% tumor maligno sólido o neoplasia hematológica activa)	2,91
Inmunosupresión actual (% sí)	3,22
Embarazo activo (% sí)	1,07
Exceso de peso (% sobrepeso/obesidad)	0,76/10,59
Tabaquismo activo (% sí)	13,82
Vacunación frente a gripe en la temporada 2019/2020 (% sí)	18,58

Tabla 2. Sintomatología característica de la muestra (n = 651)

Síntomas	% Sí	Varones	Mujeres	IC 95%
Tos	44,39	116	173	40,53-48,30
Febrícula	25,03	63	100	21,75-28,55
Odinofagia	24,27	67	91	21,02-27,75
Cefalea	19,35	52	74	16,39-22,60
Fiebre	18,74	56	66	15,81-21,95
Diarrea	18,43	47	73	15,53-21,63
Congestión nasal	17,81	47	69	14,95-21,63
Disnea	16,74	42	67	13,95-19,84
Dolor torácico	9,21	27	33	7,11-11,70
Ageusia o disgeusia	6,14	19	21	4,43-8,27
Anosmia	5,99	16	23	4,29-8,10
Vómitos	4,91	10	22	3,39-6,87
Lesiones dermatológicas	2,91	4	15	1,77-4,52

Tabla 3. Características de la evolución de la enfermedad

Evolución médica	n = 651
Valoración médica presencial (sí/% sí)	182/27,95
Lugar valoración médica (% centro de salud/domicilio/residencia/punto de atención continuada)	64,73/14,83/10,98/5,49
Asistencia en urgencias hospitalarias (sí/% sí)	58/8,9
Asistencia en urgencias hospitalarias (% por valoración médica/por su cuenta)	65,51/34,48
Ingreso hospitalario (sí/% sí)	25/3,84
PCR (domicilio/residencia Avenida/residencia Raessa/residencia Sagrada Familia/residencia Virgen de Loreto)	252/26/0/26/2
PCR (% positivas/% total realizadas)	15,03/47
PCR positivas (% domicilio/residencia Avenida)	89,13/10,86
PCR positivas (% no vacunados frente a la gripe 2019/2020)	82,60
Test rápido de anticuerpos (domicilio/residencia Avenida/residencia Raessa/residencia Sagrada Familia/residencia Virgen de Loreto)	163/2/1/0/0
Test rápido de anticuerpos (% positivos/% total realizadas)	10,84/25,49
Test rápido de anticuerpos positivo (% domicilio)	100
Test rápido de anticuerpos positivo (% no vacunados frente a la gripe 2019/2020)	94,44
Radiografía de tórax (% realizadas/% neumonía)	9,21/23,33
Analítica sanguínea (% realizadas)	7,98
Analítica sanguínea (% leucopenia/linfopenia/insuficiencia respiratoria/dímero D elevado/LDH elevado)	13,46/23,07/9,61/13,46/9,61
Antibiótico (% sí/Azitromicina/Amoxicilina/Cefuroxima)	19,2/50,4/24/8
Media de aislamiento domiciliario ± Desviación estándar	16,27 ± 14,65
Fallecimiento (sí/% sí)	7/1,07
Fallecimiento (% domicilio/residencia Avenida)	28,57/71,72

Tabla 4. Factores asociados a la infección activa y pasada (PCR y test de anticuerpos positivos)

	N	n (PCR positiva)	% (PCR positiva)	n (test de anticuerpos positivo)	% (test de anticuerpos positivo)
Género					
Masculino	277	20	43,5	7	38,9
Femenino	374	26	56,5	11	61,1
p-valor		<0,001		0,876	
Sanitario/sociosanitario	99	16	34,8	4	22,2
p-valor		<0,001		0,027	