

## Estudio investigación pielonefritis en Hospital Universitario Miguel Servet Zaragoza

**Tabla 1.** Relación entre género y antibióticos, remisión de fiebre a los cuatro días y efectos adversos.

Género	ANTIBIÓTICOS		REMISION DE LA FIEBRE 4 DÍAS		EFECTOS ADVERSOS	
	Cefalosporinas	Quinolonas	No	Sí	No	Sí
Hombre	69,2%	30,8%	67,8%	32,2%	30,1%	69,9%
Mujer	69,6%	30,4%	58,1%	41,9%	36,5%	63,5%
P-valor	0,938		0,085		0,248	

**Tabla 2.** Relación del género con variables cualitativas: edad, IMC, cigarrillos y estancia hospitalaria.

	HOMBRE		MUJER		P-valor
	Media	DT.	Media	DT	
EDAD	50,64	5,938	49,17	4,983	0,022
IMC	23,47	0,754	23,51	0,975	0,683
CIGARRILLOS	7,01	6,242	8,50	7,064	0,581
ESTANCIA HOSPITALARIA	10,78	1,700	6,66	1,664	0,000

**Tabla 4.** Antibiótico- remisión de la fiebre al 4º día y efectos adversos.

Antibiótico	REMISION DE LA FIEBRE 4 DÍAS		EFECTOS ADVERSOS	
	No	Sí	No	Sí
Cefalosporinas	71,6%	28,4%	34,3%	65,7%
Quinolonas	43,3%	56,7%	31,1%	68,9%
P-valor	0,000		0,591	

Gráfico 1. Antibióticos – Remisión de fiebre a los 4 días.




Tabla 5. Antibiótico-Estancia hospitalaria

	Cefalosporinas		Quinolonas		P-valor común
	Media	D.P	Media	D.P	
Estancia hospitalaria	8,81	2,777	8,48	2,371	0,326

Tabla 6. Relación entre el antibiótico utilizado y la evolución de la temperatura.

	Cefalosporinas			Quinolonas		
	Media	D.P	P-valor	Media	D.P	P-valor
Fiebre al ingreso	38,794	0,489	0,000	37,703	0,299	0,000
Fiebre al 2º día	37,548	1,044		36,880	0,578	
Fiebre al 2º día	37,548	1,044	0,000	36,880	0,577	
Fiebre al 4º día	37,399	0,881		36,880	0,577	
Fiebre al ingreso	38,794	0,489	0,000	38,703	0,299	0,000
Fiebre al 4º día	37,399	0,881		36,880	0,577	