

## Paciente pediátrica de 4 años con diagnóstico de neumonía más asma alérgica con Pulmonary Score moderado de 6 puntos. Presentación de caso clínico

Tabla 1: Hematología y coagulación

BIOMETRÍA HEMÁTICA			
Linfocitos		20,8 K/uL	30.00 – 42.00 K/uL
HEMATOLOGÍA Y COAGULACIÓN			
Velocidad eritrosedimentación Westergreen	de	25.0 mm/h	0.0 – 12.0 mm/h

Tabla 2: Bioquímica Sanguínea

IONOGRAFÍA Y GASOMETRÍA		
Sodio en suero	133.0 mEq/L	135 – 145 mEq/L
Potasio en suero	4.80 mEq/L	3.50 – 5.50 mEq/L

Tabla 3: Exámenes hormonales

INMUNOLOGÍA y BAAR		
IgE	56.1 IU/L	0,8 – 0 IU/L
BAAR	Muestra de esputo	Negativo para Tuberculosis

Imagen 1: Rx de Tórax Estándar



Tabla IX. *Pulmonary Score*

	<i>FR &lt; 6 a</i>	<i>FR &gt; 6 a</i>	<i>Sibilancias</i>	<i>Uso de esternocleidomastoideo</i>
0	< 30	< 20	No	No
1	31-45	21-35	Final espiración	Incremento leve
2	46-60	36-50	Toda espiración	Aumentando
3	> 60	> 50	Inspiración y espiración	Actividad máxima

\*Se puntúa de 0 a 3 en cada uno de los apartados (mínimo 0, máximo 9).

\*\*Si no hay sibilancias y la actividad del esternocleidomastoideo está aumentada, puntuar el apartado sibilancias con un 3.  
 Crisis leve: 0-3 puntos; moderada: 4-6 puntos; grave: 7-9 puntos.

El uso de músculos accesorios se refiere solo al esternocleidomastoideo, que es el único músculo que se ha correlacionado bien con el grado de obstrucción.