

## Prevalencia de ansiedad preoperatoria en el área de Cuidados Preanestésicos, en pacientes programados para Cirugía General en el Hospital General de Zona #3, Jesús María Resultados

	Porcentaje					Puntaje	
	Nunca	Poco	Frecuente	Mucho	Siempre	Media	DE
1) Estoy preocupado por la anestesia	13.1	29.9	22.4	25.5	9.0	2.9	1.2
2) Pienso continuamente en la anestesia	18.7	34.0	28.3	10.9	8.1	2.6	1.2
3) Me gustaría contar con toda la información posible sobre la anestesia	9.0	21.2	14.0	16.8	38.9	3.6	1.4
4) Estoy preocupado por la intervención	8.7	20.2	24.0	26.5	20.6	3.3	1.2
5) Pienso constantemente en la intervención	15.9	24.9	19.9	19.3	19.9	3.0	1.4
6) Me gustaría contar con toda la información posible sobre la intervención	15.6	10.6	11.5	18.4	43.9	3.6	1.5

Tabla 1: Porcentaje y puntaje de respuestas para la escala de ansiedad preoperatoria (APAIS)

	Frecuencia	Porcentaje
<b>Si</b>	251	78.2
<b>No</b>	70	21.8
<b>n=321</b>		

Tabla 2: Necesidad de información sobre la anestesia y la cirugía

	Frecuencia	Porcentaje
<b>Si</b>	192	59.8
<b>No</b>	129	40.2
<b>Total</b>	321	100

Tabla 3: Presencia de ansiedad preoperatoria

		Ansiedad preoperatoria		Total
		Si	No	
<b>Femenino</b>	fr.	106	66	172
	%	55.2%	51.2%	53.6%
<b>Masculino</b>	fr.	86	63	149
	%	44.8%	48.8%	46.4%
<b>Total</b>	fr.	192	129	321
	%	100%	100%	100%
<b>X<sup>2</sup>=0.51, df=1, n=321, p=.476</b>				
Tabla 4: Sexo y ansiedad preoperatoria				

		Ansiedad preoperatoria		Total
		Si	No	
<b>&lt;= 19</b>	fr.	4	0	4
	%	2.1%	0.0%	1.2%
<b>20 - 39</b>	fr.	79	44	123
	%	41.1%	34.1%	38.3%
<b>40 - 59</b>	fr.	58	43	101
	%	30.2%	33.3%	31.5%
<b>60+</b>	fr.	51	42	93
	%	26.6%	32.6%	29.0%
<b>Total</b>	fr.	192	129	321
	%	100%	100%	100%
<b>X<sup>2</sup>=4.8, df=3, n=321, p=.181</b>				
Tabla 5: Edad y ansiedad preoperatoria				

		Ansiedad preoperatoria		Total
		Si	No	
<b>Labores del hogar</b>	fr.	54	32	86
	%	28.1%	24.8%	26.8%
<b>Obrero/a</b>	fr.	33	19	52
	%	17.2%	14.7%	16.2%
<b>Empleado/a</b>	fr.	60	42	102
	%	31.3%	32.6%	31.8%
<b>Estudiante</b>	fr.	14	2	16
	%	7.3%	1.6%	5.0%
<b>Pensionado</b>	fr.	31	34	65
	%	16.1%	26.4%	20.2%
<b>Total</b>	fr.	192	129	321
	%	100%	100%	100%
<b>X<sup>2</sup>=9.7, df=4, n=321, p=.045</b>				

Tabla 6: Ocupación y ansiedad preoperatoria

		Ansiedad preoperatoria		Total
		Si	No	
<b>Colecistectomía abierta</b>	fr.	18	11	29
	%	9.4%	8.5%	9.0%
<b>Colecistectomía laparoscópica</b>	fr.	62	33	95
	%	32.3%	25.6%	29.6%
<b>Resección intestinal</b>	fr.	0	1	1
	%	0.0%	0.8%	0.3%
<b>Reconexión de tránsito intestinal</b>	fr.	1	1	2
	%	0.5%	0.8%	0.6%
<b>Plastia inguinal</b>	fr.	22	18	40
	%	11.5%	14.0%	12.5%
<b>Plastia umbilical</b>	fr.	26	15	41
	%	13.5%	11.6%	12.8%
<b>Plastia ventral</b>	fr.	9	8	17
	%	4.7%	6.2%	5.3%
<b>Otra</b>	fr.	26	18	44
	%	13.5%	14.0%	13.7%
<b>Toma de biopsia</b>	fr.	9	8	17
	%	4.7%	6.2%	5.3%
<b>Colocación Tenckhoff</b>	fr.	19	16	35
	%	9.9%	12.4%	10.9%
<b>Total</b>	fr.	192	129	321
	%	100%	100%	100%
<b>X<sup>2</sup>=4.5, df=9, n=321, p=.873</b>				

Tabla 7: Tipo de cirugía y ansiedad preoperatoria

		Ansiedad preoperatoria		Total
		Si	No	
<b>General</b>	fr.	56	34	90
	%	29.2%	26.4%	28.0%
<b>Regional</b>	fr.	111	84	195
	%	57.8%	65.1%	60.7%
<b>Combinada</b>	fr.	25	11	36
	%	13.0%	8.5%	11.2%
<b>Total</b>	fr.	192	129	321
	%	100%	100%	100%
<b>X<sup>2</sup>=2.3, df=2, n=321, p=.319</b>				
Tabla 8: Tipo de anestesia y ansiedad preoperatoria				