

Síntomas depresivos y abandono al tratamiento en adultos mayores con polifarmacia y diabetes mellitus 2


Tabla 1. SEXO

Frecuencia Porcentaje

Válido	Hombre	159	42.5
	Mujeres	215	57.5
	Total	374	100.0

Fuente: Instrumento de recolección de datos

Grafica 1



Fuente: Instrumento de recolección de datos.

**Tabla 2
OCUPACIÓN**

		Frecuencia	Porcentaje
Válido	Jubilado	137	36.6
	Desempleado	161	43.0
	Comerciante	42	11.2
	Empleado	34	9.1
	Total	374	100.0

Fuente: Instrumento de recolección de datos

Tabla 3
Tabla cruzada

Recuento

		ABANDONO AL TRATAMIENTO		Total
		NO	SI	
SÍNTOMAS DEPRESIVOS	NO	304	29	333
	SI	3	38	41
Total		307	67	374

Fuente: Instrumento de recolección de datos.

Tabla 4

Tabla cruzada

Recuento

		ABANDONO AL TRATAMIENTO		Total
		NO	SI	
DEPRESIÓN	Sin depresión	304	29	333
	Leve	3	23	26
	Moderada	0	13	13
	Moderada	0	2	2
Total		307	67	374

Fuente: Instrumento de recolección de datos.

Tabla 5
Tabla cruzada

DEPRESION * ABANDONO AL TRATAMIENTO

		ABANDONO AL TRATAMIENTO		Total	
		NO	SI		
DEPRESIÓN	Sin depresión	Recuento	304	29	333
		% dentro de ABANDONO AL TRATAMIENTO	99.0%	43.3%	89.0%
	Leve	Recuento	3	23	26
		% dentro de ABANDONO AL TRATAMIENTO	1.0%	34.3%	7.0%
	Moderada	Recuento	0	13	13
		% dentro de ABANDONO AL TRATAMIENTO	0.0%	19.4%	3.5%
	Severa	Recuento	0	2	2
		% dentro de ABANDONO AL TRATAMIENTO	0.0%	3.0%	0.5%
	Total	Recuento	307	67	374
		% dentro de ABANDONO AL TRATAMIENTO	100.0%	100.0%	100.0%

Fuente: Instrumento de recolección de datos.

Tabla 6
Pruebas de Chi-cuadrado

	Valor	df	Significación asintótica (bilateral)
Chi-cuadrado de Pearson	175.918 ^a	3	.000
Razón de verosimilitud	136.066	3	.000
N de casos válidos	374		

Fuente: Instrumento de recolección de datos.