


Aptitud clínica del médico familiar en la osteoartrosis de rodilla en el HGZMF2 durante el año 2021

Tabla 1. Distribución de las variables de los Médicos Familiares adscritos a la consulta externa de Medicina Familiar

	FRECUENCIA (n=50)	PORCENTAJE (%)
SEXO		
Hombre	21	42
Mujer	29	58
EDAD		
25-30 años	3	6
31-35 años	18	36
36-40 años	14	28
41-45 años	7	14
46-50 años	4	8
51-55 años	3	6
55-60 años	1	2


FUENTE: Instrumento para evaluar “Aptitud clínica del Médico Familiar en la atención de osteoartrosis de rodilla en el HGZMF2 durante el 2021”. Elaboración propia.

Gráfica 1. Clasificación de los resultados en la habilidad diagnóstica, habilidad terapéutica, registro en el expediente y jerarquización de problemas del Médico Familiar.



FUENTE: Instrumento para evaluar “Aptitud clínica del Médico Familiar en la atención de osteoartrosis de rodilla en el HGZMF2 durante el 2021”. Elaboración propia.

Gráfica 2. Resultado global de la aptitud clínica del Médico Familiar



FUENTE: Instrumento para evaluar “Aptitud clínica del Médico Familiar en la atención de osteoartrosis de rodilla en el HGZMF2 durante el 2021”. Elaboración propia.