

Deterioro cognitivo relacionado con calidad de vida en adultos mayores con polifarmacia

Tabla 1. Deterioro cognitivo

Deterioro cognitivo				Total
		Probable deterioro cognitivo	Sin deterioro cognitivo	
Sexo	Hombre	2	16	18
	Mujer	6	16	22
Total		8	32	40

Fuente: MINI-MENTAL, 2023

Tabla 2. Calidad de vida y deterioro cognitivo

Deterioro cognitivo				Total
		Probable deterioro cognitivo	Sin deterioro cognitivo	
Calidad de vida	Buena calidad de vida	5	27	32
	Mala calidad de vida	3	5	8
Total		8	32	40

Chi-Square Tests

Value		df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	1,914a	1	,167		
Continuity Correction ^b	,791	1	,374		
Likelihood Ratio	1,710	1	,191		
Fisher's Exact Test				,320	,183
Linear-by-Linear Association	1,866	1	,172		
N of Valid Cases	40				

- a. 1 cells (25,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1,60.
 b. Computed only for a 2x2 table

Fuente: MINI-MENTAL, FUMAT 2023

Tabla 3. Con quien vive

Con quién vive					
Frequency			Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Solo	5	12,5	12,5	12,5
	Familiar (es)	33	82,5	82,5	95,0
	Conocido	2	5,0	5,0	100,0
	Total	40	100,0	100,0	

Fuente: Enero-Marzo Adultos mayores del ISSSTE AGS 2023

Tabla 4.

Situación laboral					
Frequency			Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Empleado	8	20,0	20,0	20,0
	Comerciante	5	12,5	12,5	32,5
	Jubilado	22	55,0	55,0	87,5
	Al hogar	4	10,0	10,0	97,5
	Ninguno	1	2,5	2,5	100,0
	Total	40	100,0	100,0	

Fuente: Enero-Marzo Adultos mayores del ISSSTE AGS 2023