

Manejo de complicaciones pulmonares posoperatorias

Anexos

Gráfico 1: La puntuación de Wells

La puntuación de Wells*.

| | |
|--|-----------------|
| La embolia pulmonar (EP) es el diagnóstico más probable | Si = 3 puntos |
| Síntomas y signos de trombosis venosa profunda (TVP) presentes | Si = 3 puntos |
| Frecuencia cardíaca >100 latidos/minuto | Sí = 1,5 puntos |
| Inmovilización durante al menos 3 días o cirugía en las 4 semanas anteriores | Sí = 1,5 puntos |
| TVP o EP previas, diagnosticadas objetivamente | Sí = 1 punto |
| hemoptisis | Sí = 1 punto |
| Neoplasia maligna con tratamiento dentro de los 6 meses | Sí = 1 punto |

Fuente: Ishaava. F1000Res, 2020. Elaborado: Ishaava. F1000Res, 2020.

Gráfico 2: La puntuación de Ginebra revisada simplificada

La puntuación de Ginebra revisada simplificada*.

| Variable | Puntaje |
|--|---------|
| Edad ≥65 años | 1 |
| Trombosis venosa profunda (TVP) o embolia pulmonar (EP) previa | 1 |
| Cirugía o fractura dentro de 1 mes | 1 |
| malignidad activa | 1 |
| hemoptisis | 1 |
| Frecuencia cardíaca de 75 a 94 latidos por minuto | 1 |
| Frecuencia cardíaca > 95 latidos/minuto | 2 |
| Dolor unilateral de miembros inferiores | 1 |
| Dolor a la palpación profunda de miembro inferior y edema unilateral | 1 |

Fuente: Ishaava. F1000Res, 2020. Elaborado: Ishaava. F1000Res, 2020.