

## Ciática en hombres y mujeres

### Resultados

#### Variables cualitativas

Tabla 1: CVRS0

		Hombres	Mujeres	Chi-cuadrado de Pearson	Estadístico exacto de Fisher
CVRS0	Malo	80%	68,4%	0,474 25%	0,701
	Bueno	20%	31,6%		
	Total	100%	100%		

Tabla 2: CVR1

		Hombres	Mujeres	Chi <sup>2</sup>	Fisher
CVRS1	Malo	100%	65,0%	0,090 50%	0,146
	Bueno	0%	35,0%		
	Total	100%	100%		

Tabla 3: TRATAMIENTO

		Hombres	Mujeres	Chi <sup>2</sup>	Fisher
Tratamiento	Fisioterapéutico	69,2%	45,5%	0,123 0%	0,217
	Fármacos	30,8%	54,5%		
	Total	100%	100%		

Tabla 4: RESPUESTA

		Hombres	Mujeres	Chi <sup>2</sup>	Fisher
Respuesta	Adecuado	46,2%	50,9%	0,758 0%	1,000
	No adecuado	53,8%	49,1%		
	Total	100%	100%		

Tabla 5: Desarrollo de las variables cuantitativas

	Hombre Media(DE)	Mujer Media(DE)	Prueba T	Mann-Whitney
Edad	56,08 (11,391)	56,64 (13,789)	-0,136 (0,893)	
IMC	21,54 (1,198)	21,53 (1,215)		-0,121 (0,904)
EVA antes	8,31 (1,316)	7,69 (0,900)		-1,501(0,133)
EVA intermedio	5,62 (1,121)	5,38 (0,871)		-0,666(0,505)
EVA después	2,85 (1,519)	2,91 (1,602)		-0,987(0,987)

