Revista Ocronos. ISSN nº 2603-8358 (ed. digital) –2695-8201 Ocronos (ed. impresa)
Depósito legal: CA-27-2019
Revistamedica.com **- DOI:** https://doi.org/10.58842/OCRONOS

Evaluación de la profundidad anestésica mediante el Índice de Estado del Paciente (PSI) con sevoflurano a 1 Vol% en nefrectomía laparoscópica bajo anestesia general combinada con anestesia epidural continua

Anexos

Variable	Valor
Número de pacientes	6
Edad, años, media ± DE (min–máx)	54.7 ± 22.5 (21–84)
Sexo	Masculino (100%)
Talla (m), media ± DE	1.70 ± 0.104
Peso (kg), media ± DE	82.25 ± 14.65
IMC (kg/m²), media ± DE	27.84 ± 6.37
ASA, n (%)	I: 1 (16.7%)
	II: 3 (50%)
	III: 2 (33.3%)
	IV: 0 (0%)
	V: 0 (0%)
	VI: 0 (0%)
Duración del procedimiento (h)	5.46 ± 1.46

Tabla 1. Características clínicas de los pacientes sometidos a nefrectomía laparoscópica (n = 6)

Revista Ocronos. ISSN nº 2603-8358 (ed. digital) –2695-8201 Ocronos (ed. impresa)
Depósito legal: CA-27-2019
Revistamedica.com **- DOI:** https://doi.org/10.58842/OCRONOS

Variable	Media ± DE	Mediana (RIC)	Min–Máx
Frecuencia cardíaca (lpm)	72.8 ± 14.8	72 (62–79)	3–104
Frecuencia respiratoria (rpm)	14.0 ± 2.06	14 (12–15)	11–18
Presión arterial sistólica (mmHg)	108.4 ± 18.3	110 (94–123)	68–160
Presión arterial diastólica (mmHg)	67.3 ± 13.7	70 (57–79)	40–95
Presión arterial media (mmHg)	77.2 ± 11.8	78 (70–85)	45–111
Saturación de O_2 (%)	99.2 ± 1.30	100 (99–100)	94–100
PSI	34.9 ± 9.05	34 (30–37)	25–96
pCO_2 (mmHg)	32.4 ± 7.23	34 (30–37)	0–45
Volumen % sevoflurano	**1.19 ± 0.49**	**1.00 (0.80–1.50)**	**0.00–2.50**

Tabla 2. Parámetros fisiológicos monitorizados durante la nefrectomía laparoscópica (137 mediciones intraoperatorias)

Figura 1. Gráfica de dispersión del índice PSI en función del tiempo.



Figura 2. Gráfica de dispersión del Vol% de sevoflurano a lo largo del tiempo



Revista Ocronos. ISSN nº 2603-8358 (ed. digital) –2695-8201 Ocronos (ed. impresa)
Depósito legal: CA-27-2019
Revistamedica.com **- DOI:** https://doi.org/10.58842/OCRONOS

Figura 3. Gráfica de dispersión que muestra la relación bivariada entre el Vol% de sevoflurano y el índice PSI, estratificada por paciente.