Revista Ocronos. ISSN nº 2603-8358 (ed. digital) –2695-8201 Ocronos (ed. impresa)
Depósito legal: CA-27-2019
Revistamedica.com **- DOI:** https://doi.org/10.58842/OCRONOS

Factores asociados con complicaciones tras nefrectomía radical por pielonefritis xantogranulomatosa en el Hospital General Regional 66

Tablas

Tabla 1 Variables clínicas y quirúrgicas de la población

Variable	Mediana (P25–P75)
Duración de la cirugía (min)	180 (170–200)
Pérdida sanguínea (mL)	460 (410–600)
Hospitalización (días)	6 (4–7)
PCR preoperatoria (mg/L)	133,5 (74,4–185,8)
VSG preoperatoria (mm/h)	72 (42–81)
Creatinina preoperatoria (mg/dL)	1,7 (1,3–1,94)
TFG estimada por CKD-EPI 2021 (mL/min/1,73 m²)	37,2 (28,2–56,2)
Tiempo de evolución (días)	128 (60–153)

n = 15. P25–P75: percentiles 25 y 75. PCR: proteína C reactiva; VSG: velocidad de sedimentación globular; TFG: tasa de filtración glomerular. Fuente: elaboración propia.

Revista Ocronos. ISSN nº 2603-8358 (ed. digital) –2695-8201 Ocronos (ed. impresa)
Depósito legal: CA-27-2019
Revistamedica.com **- DOI:** https://doi.org/10.58842/OCRONOS

Tabla 2 Variables categóricas según la presencia de complicaciones

Variable	Categoría	Sin complicaciones n (%)	Con complicaciones n (%)	p
Sexo	Masculino	2 (40,0)	3 (60,0)	0,329
	Femenino	7 (70,0)	3 (30,0)	
Estado nutricional	Normal	4 (57,1)	3 (42,9)	1,000
	Obesidad	5 (62,5)	3 (37,5)	
Comorbilidad	Hipertensión arterial	1 (33,3)	2 (66,7)	0,784
	Diabetes mellitus tipo 2	1 (50,0)	1 (50,0)	
	Enfermedad renal crónica	1 (100,0)	0 (0,0)	
	Dislipidemias	2 (50,0)	2 (50,0)	
	Otras comorbilidades	4 (80,0)	1 (20,0)	
Técnica quirúrgica	Abierta	7 (53,8)	6 (46,2)	0,486
	Laparoscópica	2 (100,0)	0 (0,0)	

Sin complicaciones: n = 9; con complicaciones: n = 6. Los porcentajes se calculan dentro de cada categoría. Prueba exacta de Fisher; el valor de p de comorbilidad corresponde a la comparación global. Fuente: elaboración propia.

Nota de revisión: la clasificación del estado nutricional de esta tabla requiere conciliación con los valores de IMC de la tesis y de la tabla 3 antes del envío.

Revista Ocronos. ISSN nº 2603-8358 (ed. digital) –2695-8201 Ocronos (ed. impresa)
Depósito legal: CA-27-2019
Revistamedica.com **- DOI:** https://doi.org/10.58842/OCRONOS

Tabla 3 Variables continuas según la presencia de complicaciones

Variable	Sin complicaciones Mediana (RIC)	Con complicaciones Mediana (RIC)	p
Edad (años)	68 (27)	51 (35)	0,607
Peso (kg)	65,3 (23,9)	63,7 (16,5)	0,776
Talla (cm)	160,2 (14,8)	162,4 (11,5)	0,224
IMC (kg/m²)	25,5 (6,1)	23,6 (5,3)	0,224
Duración de la cirugía (min)	190 (45)	175 (43)	0,224
Pérdida sanguínea (mL)	460 (320)	435 (105)	0,272
PCR preoperatoria (mg/L)	119,5 (89,6)	163,1 (74,2)	0,145
VSG preoperatoria (mm/h)	47 (44)	77 (11)	0,113
Creatinina preoperatoria (mg/dL)	1,40 (0,82)	1,93 (0,79)	0,088

Sin complicaciones: n = 9; con complicaciones: n = 6. RIC: amplitud del rango intercuartílico (P75 − P25). Comparaciones mediante U de Mann–Whitney. IMC: índice de masa corporal; PCR: proteína C reactiva; VSG: velocidad de sedimentación globular. Fuente: elaboración propia.