Revista Ocronos. ISSN nº 2603-8358 (ed. digital) –2695-8201 Ocronos (ed. impresa)
Depósito legal: CA-27-2019
Revistamedica.com - DOI: https://doi.org/10.58842/OCRONOS

Relación de las complicaciones postoperatorias mediatas tras hernioplastia bilateral de Lichtenstein vs Rives-Stoppa

Tablas

Tabla 1. Características sociodemográficas y factores de riesgo de la población estudiada.

Variable	Lichtenstein bilateral (n=141)	Rives-Stoppa (n=19)	p
Edad, años, media ± DE	53.6 ± 15.3	49.6 ± 15.0	0.277
Sexo masculino, n (%)	125 (88.7)	14 (73.7)	0.138
Factores de riesgo presentes, n (%)	117 (83.0)	14 (73.7)	0.344

Tabla 2. Resultados quirúrgicos y complicaciones postoperatorias mediatas.

Variable	Lichtenstein bilateral (n=141)	Rives-Stoppa (n=19)	p
Tiempo quirúrgico, min, mediana (RIC)	87 (76-96)	112 (108-133)	<0.001
Estancia intrahospitalaria, días, mediana (RIC)	1 (1-1)	3 (2-3)	<0.001
Cualquier complicación mediata, n (%)	25 (17.7)	3 (15.8)	1.000

Tabla 3. Distribución de las complicaciones postoperatorias mediatas.

Complicación	Lichtenstein bilateral, n (%)	Rives-Stoppa, n (%)	Total, n (%)
Seroma	11 (7.8)	1 (5.3)	12 (7.5)
Hematoma	4 (2.8)	1 (5.3)	5 (3.1)
Inguinodinia	5 (3.5)	0 (0.0)	5 (3.1)
Infección	3 (2.1)	1 (5.3)	4 (2.5)
Recidiva	2 (1.4)	0 (0.0)	2 (1.3)
Total de pacientes con complicación	25 (17.7)	3 (15.8)	28 (17.5)

Nota: Los datos de las tablas corresponden a la base final reportada en la tesis fuente. Debido al pequeño número de eventos del grupo Rives-Stoppa, las comparaciones por tipo de complicación deben interpretarse de manera descriptiva.