Revista Ocronos. ISSN nº 2603-8358 (ed. digital) –2695-8201 Ocronos (ed. impresa)
Depósito legal: CA-27-2019
Revistamedica.com **- DOI:** https://doi.org/10.58842/OCRONOS

Impacto del tratamiento de la vejiga hiperactiva en las comorbilidades asociadas

EFECTO DEL TRATAMIENTO EN LAS ENFERMEDADES CONCOMITANTES:

Área Evaluada	***Impacto del Tratamiento de la VH***	***Resultado Clínico Global***
Salud Mental	Reducción de la ansiedad de escape; mejora de la autoestima y reactivación social.	Disminución en los índices de depresión secundaria.
Arquitectura del Sueño	Reducción de episodios de nocturia (1-3 episodios menos por noche).	Disminución de la fatiga crónica y mayor control de la presión arterial.
Movilidad y Traumatología	Disminución de las carreras nocturnas al baño.	Caída significativa en la incidencia de fracturas por caídas.
Gasto Sanitario	Reducción de urgencias médicas asociadas a complicaciones (fracturas, infecciones).	Optimización del uso de recursos en atención primaria.

Pruebas Complementarias y de Gabinete

Prueba	***Función e Indicación***
Ecografía Renovesical	Mide el residuo postmiccional (RPM) para descartar retención urinaria o vaciamiento incompleto antes de iniciar fármacos antimuscarínicos.
Citología Urinaria	Indicada en pacientes con hematuria o con factores de riesgo (ej. tabaquismo) para descartar carcinoma *in situ* de vejiga.
Estudio Urodinámico	No es de rutina inicial. Reservado para casos refractarios al tratamiento, sospecha de etiología neurógena compleja o previa a intervención quirúrgica. Muestra la presencia de hiperactividad del detrusor.